

ممکن است در سه ماهه دوم بارداری دهانه‌ی رحم در معرض باز شدن (اتساع) بدون درد قرار گیرد و کیسه‌ی آب جنین به داخل مجرای زایمانی (واژن) برآمده شود که به آن نارسائی دهانه‌ی رحم (نارسایی سرویکس) گفته می‌شود و باعث زایمان زودرس جنین می‌گردد.

در صورتیکه شما در معرض خطر نارسایی سرویکس و زایمان زودرس هستید با صلاحدید متخصص زنان و زایمان، عمل جراحی سرکلاژ برای شما انجام می‌شود و تحت بیهوشی عمومی یا بی‌حسی موضعی دهانه‌ی رحم شما با نخ مخصوص دوخته می‌شود تا به این ترتیب تولد نوزاد تا زمان مناسب به تعویق بیفتد.



۱

کاربرد سرکلاژ:

★ عمل سرکلاژ را می‌توان به عنوان پیشگیری قبل از باز شدن دهانه‌ی رحم و یا بصورت اورژانس بعد از باز شدن دهانه رحم انجام داد.

★ عمل سرکلاژ عموماً بین هفته‌ی ۱۲ و ۱۶ بارداری انجام می‌گیرد.

چه موقع نباید سرکلاژ انجام شود:

- در صورت خونریزی واژینال
- وجود انقباضات رحمی
- پارگی کیسه‌ی آب جنین

قبل از سرکلاژ چه اقداماتی انجام می‌شود:

❖ قبل از انجام سرکلاژ، پزشک لازم است از زنده بودن جنین و عدم وجود ناهنجاری

۲

جنینی مطمئن شود، که این کار به کمک سونوگرافی و تست‌های تشخیصی دیگر انجام می‌شود.

❖ لازم است حداقل یک هفته قبل از عمل جراحی نزدیکی جنسی محدود شود.

❖ شب قبل از عمل، شام سبک میل کنید و از نیمه شب ناشتا بمانید.

❖ قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آلات، اجسام فلزی، گیره‌ی سر، لنز، دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید.

❖ کلیه‌ی لباسها، حتی لباس زیر و جوراب‌های خود را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل را بپوشید.

❖ لاک ناخن‌ها و آرایش خود را پاک کنید.

❖ قبل از خروج از بخش جراحی، ادرار خود را تخلیه کنید.

۳



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مرکز آموزشی درمانی ضیائیان
NoSW10



در مورد

سرکلاژ
سرکلاژ

چه می دانید؟

تابستان ۱۳۹۹

پمفلت آموزشی مددجو

سرکلاژ لازم است در پایان هفته ۳۷ بارداری خارج شود.

❖ دستورات دارویی را که توسط پزشک برای دوران پس از عمل سرکلاژ تجویز شده حتماً رعایت کنید.

❖ سرکلاژ دلیلی برای انجام سزارین نیست.

علایم هشدار دهنده:

- بروز انقباض رحمی و درد زیر شکم و کمر مثل دردهای زایمان
- خونریزی واژینال
- تب بالای ۳۸ درجه و یا لرز
- تهوع و استفراغ
- پارگی کیسه‌ی آب و یا خروج مقداری مایع روشن به صورت دفعی از واژن و یا مداوم.
- ترشحات زیاد واژینال

جهت دسترسی به مطالب آموزش سلامت و دانلود

پمفلت‌های آموزش به بیمار

و یا <http://www.ziaeian.ir>

<http://help.tums.ac.ir>

جهت ارائه پیشنهاد و انتقاد

Ziaeian@tums.ac.ir

مراقبت‌های بعد از انجام سرکلاژ:

❖ ممکن است تا یکی دو روز بعد از عمل لکه‌بینی داشته باشید.

❖ بعد از انجام عمل سرکلاژ معمولاً چند ساعت در بخش تحت مراقبت قرار خواهید گرفت و سپس مرخص می‌شوید.

❖ بعد از عمل چند روز در منزل استراحت و از انجام کارهای سنگین اجتناب کنید.

❖ لازم است حداقل یک الی دو هفته بعد از عمل جراحی، نزدیکی جنسی محدود شود.

❖ در صورت بروز نشانه‌های سقط یا زایمان قریب الوقوع، بخیه‌ها باید بلافاصله آزاد شوند، در صورت عدم انجام این کار ممکن است،

انقباضات شدید رحم سبب پارگی رحم گردد.

❖ در صورتیکه حاملگی تا انتها ادامه یابد نخ