

آمپول کلگزان، انوکسپرین سدیم و یا سلکسان یک فرآورده‌ی دارویی ضد انعقاد است که از تشکیل لخته در یک سیاهرگ یا سرخرگ یا عود آن پیشگیری می‌کند.

#### موارد استفاده:

بعد از جراحی مفصل زانو، لگن، جراحی شکم، درمان ترمبوز وریدهای عمقی، پیشگیری از عوارض بعد از سکته‌ی قلبی، انواع خاصی از بیماری‌های قلبی، بی‌حرکی یا شکستگی استخوان‌های لگن و ران و احتمال لخته شدن خون در وریدهای عمقی پاها و نیز برای کاهش خطر آمبولی در بیماران بستری و یا در بیماران بخش مراقبت‌های ویژه که قادر به حرکت نیستند استفاده می‌شود.

#### عوارض جانبی:

خونریزی گوارش، کبودی پوست، خون دماغ و مدفوع سیاه.

#### موارد احتیاط:

بیمار از نظر خونریزی بدقت بررسی گردد: در فشارخون بالای کنترل نشده، خونریزی مغزی، بیماری‌هایی که تحت عمل جراحی تهاجمی قرار می‌گیرند، بلافاصله بعد از عمل جراحی مغز- نخاع- چشم- بیماری‌های کبدی، در بیماران نارسایی کلیوی، در بیماران مسن به دلیل تاخیر در دفع دارو و در صورت خونریزی مصرف دارو قطع شود.

#### ملاحظات اختصاصی:

❖ قبل از مصرف دارو مراقب هر گونه خونریزی باشید و از فعالیت‌هایی که شانس خونریزی را افزایش می‌دهد، پرهیز کنید.

❖ دارو را با دیگر داروها مخلوط نکنید.

❖ حباب هوای داخل سرنگ را خارج نکنید، چون ممکن است باعث کاهش مقدار دارو شود.

❖ دارو را بصورت عضلانی تزریق نکنید.

❖ دارو را بصورت عمیق و زیر جلدی در دیواره‌ی قدامی و خلف جدار شکم تزریق کنید.

❖ مصرف همزمان با داروهای ضدانعقاد (وارفارین یا آسپرین و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی NSIDها) تنها با اجازه پزشک صورت گیرد.

#### روش صحیح تزریق دارو:

❖ دارو آماده‌ی تزریق از داروخانه تحویل شما می‌گردد.

❖ دارو را هر روز سر ساعت معین به خودتان تزریق نمایید.

❖ دست‌های خود را با آب و صابون بشوید.

❖ در وضعیت راحت طوری بنشینید و یا دراز بکشید که بتوانید ناحیه‌ی شکم را ببینید.

❖ ناحیه‌ای در سمت راست و یا چپ ناف که حداقل پنج سانتی‌متر از ناف فاصله داشته باشد و به طرف پهلوها باشد را انتخاب نمایید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  
مرکز آموزشی درمانی ضیائیان  
No C۱۵



# کلگزان

در مورد  
چه می دانید؟

تابستان ۱۳۹۹  
پمفلت آموزشی مددجو

**اگر یک دوز از کلگزان را فراموش کردید:**

✓ به دلیل اهمیت مصرف دارو همیشه زمان استفاده از کلگزان را با یک فعالیت روزانه‌ی خود تنظیم کنید که فراموش نشود.

✓ در صورت فراموش کردن دارو به هیچ عنوان دوز دارو را دو برابر نکنید و سریعاً با پزشک خود در مورد زمان مصرف دوز بعدی دارو مشورت کنید.

**بازرسی سلامتی برای شما منجر می‌گردد**

جهت دسترسی به مطالب آموزش سلامت و دانلود

پمفلت‌های آموزش به بیمار

و یا [http:// ziaeian.ir](http://ziaeian.ir)

<http://help.tums.ac.ir>

جهت ارائه پیشنهاد و انتقاد

[Ziaeian@tums.ac.ir](mailto:Ziaeian@tums.ac.ir)

◆ محل تزریق را با پنبه و الکل تمیز کرده و اجازه دهید تا خشک شود.

◆ سر پوش سرسوزن را با احتیاط بردارید.

◆ با دستی که با آن می‌نویسید سرنگ را مثل قلم در دست بگیرید و تمامی طول سوزن را به طور عمودی (۹۰ درجه) بداخل یک چین پوستی که بین انگشت شست و انگشت سبابه بوجود آورده‌اید فرو کنید، لازم است تمام طول سوزن را در داخل چین پوستی وارد کنید و چین پوستی بایستی در تمام طول مدت تزریق بین انگشتان دست نگه‌داشته شود.



◆ پیستون را به سمت پایین فشار دهید تا سرنگ خالی شود.

◆ سوزن را به طور مستقیم خارج کرده و سرنگ استفاده شده را در محفظه ایمن بیندازید.

◆ محل تزریق را ماساژ ندهید.