

سوزاک چیست ؟

سوزاک عبارت است از یک بیماری عفونی در دستگاه تناسلی، که از راه آمیزشی منتقل می شود. این عفونت در تمام سنین و در هر دو جنس رخ می دهد.

حداکثر شیوع این عفونت بین ۲۰ تا ۳۰ سالگی است. دوره -ی کمون بیماری (از زمان ورود میکروب تا بروز علائم) ۲ تا ۱۰ روز می باشد.

دوره ی تظاهر این بیماری نیز کوتاه مدت است و معمولاً ۳ تا ۱۴ روز پس از تماس مشکوک طول می کشد تا بیماری خودش را نشان دهد.

راه های انتقال سوزاک:

این بیماری، توسط یک عامل بیماری زا به نام "نایسریا گنوره آ" در اثر تماس جنسی از فرد آلوده به فرد سالم منتقل می شود.

علائم ابتلا به سوزاک :

درصد کمی از افراد بدون نشانه ی بالینی هستند.

✓ سوزش به هنگام ادرار
✓ ترشحات غلیظ به رنگ سبز - زرد از مجرای ادراری تناسلی

✓ تب خفیف و یا لرز بدون تب

✓ گاهی درد به هنگام مقاربت

✓ درد مفاصل به خصوص در ناحیه مچ دست و مچ پا

✓ ورم مفاصل

✓ بثورات پوستی

✓ گاهی گلو درد خفیف تا شدید

درمان:

درمان آنتی بیوتیکی مناسب، با توجه به مرحله ی بیماری و طبق نظر پزشک تجویز می گردد.

در تمام دوره ی درمان بهتر است با پزشک خود مشاوره کنید.

* این بیماران باید از نظر سایر بیماری های آمیزشی مورد آزمایش قرار بگیرند.

* به هنگام درمان، باید از ملحفه و روانداز مجزا استفاده شود.

* بیماران باید دستان خود را به خصوص پس از اجابت مزاج بشویند و از دست زدن به چشمان شان خودداری کنند.

پیشگیری:

◀ داشتن روابط جنسی سالم و مشروع، پرهیز از بی بندوباری های جنسی و روابط خارج از چارچوب خانواده.

◀ استفاده از کاندوم.

سیفلیس چیست؟

سیفلیس بیماری عفونی است که در اثر انتقال نوعی باکتری به نام "تربونما پالیدوم" ایجاد می شود.

بیماری باعث ایجاد یک زخم در محل عفونت می گردد و با گذشت زمان موجب آسیب به ارگان های زیادی می شود.

علائم:

علائم و نشانه های سیفلیس بسته به اینکه بیماری در کدامیک از چهار مرحله (اولیه، ثانویه، نهفته و ثالثیه) باشد، متفاوت است.

مرحله ی اولیه: با شانکر (زخم سفت، بدون درد و خارش بر روی پوست) بروز می کند.

مرحله ی ثانویه: با دانه های که بیشتر در کف دست و کف پا انتشار می یابند همراه است.

مرحله ی نهفته: یا علائم کمی دارد یا هیچ علامتی ندارد.

مرحله ی ثالثیه: با گوم ها و علائم عصبی یا قلبی همراه می باشد. در مراحل پایانی، یک سیفلیس درمان نشده باعث مشکلات قلبی جدی، اختلالات ذهنی، کوری، اختلالات عصبی و مرگ می گردد.

برای تشخیص این بیماری، پزشک مقداری از **زخم مشکوک** را جدا می کند و به آزمایشگاه می فرستد.

آزمایش خون هم می تواند **حضور پادتن ها** را در خون تایید کند. در سیفلیس پنهان نیز تنها راه فهمیدن و تشخیص بیماری **آزمایش خون** است.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 معاونت درمان - مدیریت امور پرستاری
 No ۱۹



درمورد

سوزاک و سیفلیس

چه می‌دانید؟

بهار ۱۴۰۰

بمفlet آموزشی مددجو

درمان:

آنتی‌بیوتیکی مناسب، با توجه به مرحله‌ی بیماری و طبق نظر پزشک، تجویز می‌گردد.

در تمام دوره‌ی درمان بهتر است، با پزشک خود مشاوره کنید.

پیشگیری:

اجتناب از هرگونه رفتار جنسی پرخطر

تشخیص و درمان سریع بهترین راه پیشگیری سفلیس می‌باشد.

پالازوی سلامتی برای شما مددجوی گرامی

جهت دسترسی به مطالب آموزش سلامت و دانلود
 بمفlet های آموزش به بیمار

یا <http://ziaeian.ir>

<http://help.tums.ac.ir>

جهت ارائه پیشنهاد و انتقاد

Ziaeian@tums.ac.ir

توجه نمایید:

اگر بر روی آلت تناسلی، زخم بدون دردی دیدید، به سادگی از کنار آن رد نشوید و به سرعت به پزشک خود مراجعه کنید. زیرا هر کدام از آنها ممکن است علائم ابتلا به سیفلیس باشد.

معالجه در دوره‌ی ابتدایی بیماری، از انتشار بیماری و عوارض خطرناک آن و عواقب وحشتناک بسیاری جلوگیری می‌نماید.

عوارض سیفلیس:

تقریباً نزدیک به ۳ الی ۷ درصد بیماران درمان نشده، به سیفلیس عصبی مبتلا می‌گردند. زمان بین ایجاد عفونت تا بروز علائم سیفلیس می‌تواند بیشتر از ۲۰ سال باشد. در برخی مبتلایان به سیفلیس عصبی هیچ علامتی دیده نمی‌شود. در برخی به علت التهاب مغزی، سر درد، سفتی گردن و تب ایجاد می‌گردد و برخی بیماران به صرع مبتلا می‌شوند.

همچنین آمار نشان می‌دهد، کسانی که دچار سیفلیس هستند تا پنج برابر بیشتر در خطر ابتلا به ایدز هستند. این امر به دلیل وجود زخم بر روی آلت تناسلی و آسان کردن عبور ویروس به داخل بدن است.