

چربی‌ها، پروتئین‌ها (انواع گوشت و حبوبات)، لبیات و میوه و سبزیجات) توصیه می‌گردد.

★ اگر دسترسی به متخصص تغذیه محدود بود، بهتر است برنامه‌ای منظم از متخصص تغذیه دریافت کنید. در غیر اینصورت به توصیه‌های پزشک معالج خود گوش کنید.

ورزش:

* در فردی که قبلاً ورزش نمی‌کرده، شروع ناگهانی ورزش توصیه نمی‌شود.

* افراد ورزشکار با نظر پزشک به فعالیت خود به صورت محدود ادامه دهند.

* پیاده روی در محیطی آرام با هوای پاک، روزانه نیم ساعت توصیه می‌شود.

فعالیت و استراحت:

✓ برای مادر سالم باردار، مسافت، داشتن کار، شغل و فعالیت‌های روزانه‌ی زندگی معنی ندارد.

✓ بهترین وضعیت برای استراحت خواهد بود پهلو(چپ) است که خونرسانی و اکسیژن‌رسانی بهتری برای جنین صورت می‌گیرد.

✓ رانندگی از ماہ هفتم به بعد منوع است.

واکسیناسیون:

واکسیناسیون هپاتیت، کزان، آنفلوانزا در بارداری توصیه می‌شود. برای اطلاع از چگونگی و زمان تزریق آن با پزشک خود مشورت کنید.

مراقبتهای دندانپزشکی:

★ معاینات دندانپزشکی حداقل یک بار در حاملگی توصیه

یکبار در هفته ۲۴ الی ۳۰ آزمایشات روتین بارداری را انجام دهد و در صورت نیاز ممکن است بر اساس تشخیص پزشک آزمایشات بیشتری در موارد خاص انجام دهد.

حاملگی‌های پر خطر:

در صورتیکه به فشارخون، دیابت، صرع و سوءتفعیله مبتلا هستید و یا سابقه‌ی سقط، دیابت بارداری، ناهنجاری جنینی و غیره را دارید، ممکن است به مراقبتهای خاص نیازمند باشید و تاریخ مراجعات شما نزدیکتر باشد.

صرف مکمل‌های غذایی:

♦ قرص اسیدولیک تا هفته‌ی ۱۶ بارداری.

♦ مصرف قرص آهن + قرص اسیدولیک، از هفته‌ی ۱۶ به بعد.

♦ این رژیم در مورد مادران سالم باردار می‌باشد، اضافه کردن سایر مکمل‌ها و داروها بنا به نظر پزشک معالج باید انجام شود.

تذکر در مورد مصرف داروهای:

✖ به محض اطلاع از بارداری، لازم است مصرف کلیه‌ی داروهایی را که قبلاً مصرف می‌کردید به اطلاع پزشک برسانید.

✖ از خوردن هر گونه دارو و مسکن (به خصوص در سه ماهه‌ی اول) بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.

رژیم غذایی:

★ در مادری که سالم است و بیماری خاصی ندارد، مصرف متعادل از ۵ گروه غذایی (کربوهیدرات‌ها،

مادر عزیز توصیه می‌شود که از ابتدای بارداری تحت نظر یک پزشک باشید این کار دو حسن دارد:

★ ایجاد رابطه‌ی عاطفی بین مادر و پزشک.

★ شناخت دقیق مادر باردار توسط فرد معینه کننده و انجام اقدامات فوری و به موقع در موقع اورژانس.

قبل از بارداری:

1. مشاوره‌ی زوجین.

2. انجام آزمایشات سلامت زوجین.

3. مصرف اسید فولیک از ۳ ماه قبل از بارداری.

تشخیص بارداری:

به هنگام قطع قاعدگی در اولین فرصت جهت تشخیص بارداری به پزشک یا ماما، مراجعت نمایید.

زمان ویزیت‌ها:

1. از ابتدای بارداری تا هفته‌ی ۲۸، ماهیانه.

2. از هفته‌ی ۲۸ تا هفته‌ی ۳۶، هر دو هفته.

3. از هفته‌ی ۳۶ تا هفته‌ی ۴۰، هر هفته.

آزمایشات غربالگری:

در صورت تشخیص پزشک نوبت اول آزمایش غربالگری ناهنجاری جنین در هفته‌ی ۱۱ الی ۱۳

بارداری و نوبت دوم غربالگری در هفته‌ی ۱۵ الی ۱۷ بارداری می‌باشد این آزمایشات برای تشخیص ناهنجاری‌های ژنتیکی (مادرزادی) جنین می‌باشند.

آزمایشات دوران بارداری:

هو مادر باردار می‌باشد یکبار در هفته‌ی ۶ الی ۱۰ و



مراقبت های دوران بارداری

بهار ۱۴۰۰

پمفت آموزشی مددجو

- ✓ عقب ماندگی ذهنی و مشکلات یادگیری.
- ✓ تولد زود هنگام نوزاد.
- ✓ مرگ نوزاد.

رعایت بهداشت فردی:

استفاده از لباس راحت و کفش مناسب دوران بارداری استحمام مرتباً و رعایت بهداشت دست‌ها.

در صورت مشاهدهٔ علائم هشدار دهندهٔ زیر مراجعه به بیمارستان ضروری است:

خونریزی یا لکه‌بینی، سردرد شدید یا دائم، تاری دید و دوبینی، سرگیجه، دردشکم و درد پایین جناغ سینه، استفراغ مداوم، تب و لرز، دفع ادرار دردناک یا کاهش ادرار، کاهش یا افزایش حرکات جنین، افزایش سریع وزن بدن، تنگی نفس، غش و بی‌حالی مکرر.

علایم زایمان:

آبریزش (خروج آب در واژن)، درد شکم به صورت سفت و شل شدن رحم (انقباض رحمی) و دیدن لکه خون.

جهت دسترسی به مطالب آموزش سلامت و دانلود

پمفت‌های آموزش به بیمار

و یا <http://ziaeian.ir>

<http://help.tums.ac.ir>

جهت ارائه پیشنهاد و انتقاد

Ziaeian@tums.ac.ir

می‌شود.

* رعایت بهداشت دهان و دندان در حاملگی بسیار مهم است.

* بهترین زمان جهت این درمانها سه ماهه‌ی دوم بارداری می‌باشد.



توصیه‌هایی در مورد تهوع صحبتگاهی:

• مقداری بیسکویت یا غلات خشک (نان)، صبح قبل از زیرون آمدن از رختخواب بخورید.

• غذاها را کم حجم و به دفعات مصرف کنید.

• آهسته حرکت کنید و نفس عمیق بکشید.

• از خوردن غذاهای پرادویه، سرخ‌کرده و چرب پرهیز کنید.

• مکرراً آب بنوشید.

• معده‌ی شما نباید خالی باشد.

مقابله با بیوست:

* غذاهای غنی از فیبر (میوه و سبزی) بخورید.

* مایعات بیشتری بنوشید.

* پیاده روی کنید.

* قهوه را قطع کنید.

* برای جلوگیری از نفخ شکم به آهستگی غذا بخورید و خوب بجوید.

* از مصرف نوشابه‌های گازدار و غذاهای نفاخ مثل لوییا، کلم، فلفل سبز و پیاز و غیره، پرهیز کنید.

صرف دخانیات، قلیان و سیگار موجب:

✓ کاهش وزن نوزاد در هنگام تولد.